

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/brush-baby-kidzsonic-szczoteczka-bateryjna-soniczna-dla-dzieci-w-wieku-3-flaming-2-koncowki-p-1277.html>



BRUSH-BABY - KIDZSONIC szczoteczka bateryjna soniczna dla dzieci w wieku 3+ Flaming 2 końcówki

Cena	93,00 zł
Kod EAN	5060178102895
Producent	Brush-Baby KidzSonic GoKidz

Opis produktu

Szczoteczka dla dziecka 3+ lat

- technologia soniczna - dzięki ruchom wibracyjnym włosie szczoteczki jest wprawiane w ruch przez co płytka nazębna jest dużo lepiej usuwana w stosunku do szczoteczki manualnej
- 2-minutowy timer (automatycznie wyłączy się po dwóch minutach)
- 30-sekundowy timer - przypomina dziecku o zmianie mycia ćwiartki łuku zębowego
- 2 tryby pracy - podświetlenie bez wibracji sonicznych lub kolorowe światła z ruchami sonicznymi
- wibracje - 22 000 drgań/minutę
- mała główka dopasowana do wieku dziecka
- wyjątkowo miękkie włosie
- włosie różnej długości - dzięki czemu szczoteczka dobrze redukuje płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych
- mała, lekka rękojeść - dobrze leży w dłoni dziecka
- w zestawie dołączona bateria AAA
- w zestawie jedna końcówka czyszcząca

Zawartość zestawu:

- 1 x szczoteczka KidzSonic 3+
- 2 x końcówka czyszcząca
- 1 x bateria AAA
- 1 x instrukcja w języku polskim i angielskim

DO szczoteczki pasują końcówki KidzSonic 3+, KidzSonic 3-6lat, KidzSonic 6+, BrushBaby 18-36PRO

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębów jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z jedzeniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się [produkty do remineralizacji szkliwa](#).

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.

