

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/brush-baby-pro-wybor-koloru-szczoteczka-elektryczna-soniczna-dla-dzieci-w-wieku-0-3-lat-p-1131.html>



BRUSH-BABY PRO wybór koloru - szczoteczka elektryczna, soniczna dla dzieci w wieku 0-3 lat

Cena	44,00 zł
Cena poprzednia	49,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	487
Producent	Brush-Baby KidzSonic GoKidz

Opis produktu

Szczoteczka została zaprojektowana w taki sposób aby pomóc rodzicom **wzachowaniu optymalnej higieny** jamy ustnej swoich dzieci. Szczoteczka BabySonic ze swoim **miękkim włosiem** oraz **delikatnymi drganiami** jest idealnym narzędziem pozwalającym najmłodszym na **delikatne** oraz **dokładne** czyszczenie powierzchni zębów i dziąseł. Szczoteczka BabySonic wyposażona jest w **dwuminutowy timer**, który co **30 sekund** sygnalizuje konieczność przejścia do następnej ćwiartki łuku zębowego. Timer pomaga w **czyszczeniu i wyrabianiu** od najmłodszych lat odpowiednich nawyków higienizacyjnych.

Zalety szczoteczki sonicznej BabySonic:

- mała głowka szczoteczki - idealna dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat
- wyjątkowo miękkie włosie, delikatne wibracje oraz wygodny uchwyt
- 2-minutowy timer - informuje o konieczności przejścia do następnego fragmentu łuku zębowego
- wymienna głowica (w zestawie 2 głowice czyszczące)
- UWAGA - produkt przeznaczony do stosowania pod kontrolą rodziców

Zawartość zestawu:

- 1 x szczoteczka BabySonic
- 2 x końcówka czyszcząca
- 1 x bateria AAA
- 1 x instrukcja w języku polskim i angielskim

1-szy etap dziecko w wieku 0-3 lat

W tym wieku dzieci zaczynają ząbkować lub też mają pierwsze zęby. Okres ten jest bardzo ważnym etapem rozwoju dziecka ponieważ kształtuje się cały narząd żucia. Musimy dlatego pamiętać o prawidłowej higienie zębów mlecznych.

Dlaczego należy czyścić zęby dzieciom?

Płytką nazębna oraz resztki pokarmowe **gromadzą się** na dziąsłach oraz zębach dziecka w takim samym stopniu jak u osób dorosłych. Kiedy płytka **nie będzie usuwana** może wystąpić **zapalenie dziąseł** oraz **próchnica** w zębach mlecznych.

Jak czyścić dziąsła oraz zęby dziecka?

- **usiąść z dzieckiem** w dogodnej pozycji (staraj się unikać pozycji leżącej)
- używaj szczoteczki z **małą główką** oraz miękkim włosiem
- unikaj past z **dużą zawartością fluoru**
- ilość stosowanej pasty powinna być **minimalna**
- pamiętaj o **czyszczeniu** oraz **masażu** dziąseł dziecka
- Wygodnym elementem codziennej higieny jest stosowanie gryzaka połączonego ze szczoteczką. Oczyszcza on zęby podczas zabawy w ciągu całego dnia.

Co z pastą do zębów?

Smak i konsystencja pasty do zębów jest **bardzo ważnym elementem** w tym wieku, więc staraj się wybierać takie aby zachęcić swoje dziecko do mycia zębów.

Pasty Brush-Baby zawierają zarówno fluor i xylitol - dlaczego?

Fluor zawarty jest w większości past do zębów, ponieważ **wzmacnia szkliwo** zębów chroniąc je przed **próchnicą**.

Od **6 miesięcy** do **3 roku życia** dziecka zęby rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Jeżeli będziemy aplikować dziecku pastę z **dużą zawartością** fluoru (1500 ppm lub więcej) istnieje ryzyko zatrucia, gdyż dzieci nie mają wyuczonego jeszcze na tym etapie rozwoju odruchu wypluwania nadmiaru pasty. Bezpośrednie objawy zatrucia fluorem to **plamy na zębach** oraz symptomy takie jakie występują przy zwykłym zatruciu. Zatrucie fluorem powszechnie nazywane jest **fluorozą**.

Oto kilka porad, jak prawidłowo stosować pasty z fluorem:

- zawsze używaj pasty odpowiedniej dla wieku dziecka, chyba że została polecona inna przez lekarza stomatologa
- niemowlęta i małe dzieci mają tendencję do połykania pasty więc nakładaj jej **bardzo mało**
- pastę po myciu zębów **należy wypluć**
- nie płukać jamy ustnej po myciu zębów, w ten sposób fluor pozostaje w ustach przez co wzmacnia szkliwo na dłuższy czas
- nie pozwalajmy dzieciom na zjadanie pasty

Pasty do zębów również zawierają xylitol - cukier, który jest przyjazny dla naszych zębów. Bakterie wywołujące próchnicę nie mogą z niego korzystać, więc nie produkują kwasów, które niszczą zęby. Badania wykazały, że fluor działa lepiej w obecności xylitolu.

„

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: różowa , żółta

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębów jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z żęzieniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość

życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się [produkty do remineralizacji szkliwa](#).

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.