Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:46

Link do produktu: https://www.annapapuga.pl/curaprox-smart-cs7600-szczoteczka-dla-dzieci-i-doroslych-p-471.html



Curaprox Smart CS7600 szczoteczka dla dzieci i dorosłych

Cena	**24,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**510**
Producent	**Curaprox Curaden**

Opis produktu

Szczoteczka SMART

Dla dzieci powyżej 5 roku życia i dorosłych. Ilość włókien 7600 ®, włókna CUREN o średnicy 0,08 mm.

Niech Twoje dziecko poczuje się jak dorosły :)

niech osoba dorosła z małą szczęką nie czuje dyskomfortu ze zbyt dużą główką szczoteczki.

Szczoteczka SMART jest miniaturą szczoteczki CS5460.

Nna główce tej szczotki umieszczono 7600 ultracienkich (0,08 mm), ciasno stłoczonych włosków. Wyjątkowo delikatne włoski wykonane z tworzywa CUREN docierają do każdego miejsca wokół zęba i dziąsła, nie wycierając przy tym szyjki zęba. Doskonale czyści powierzchnię zęba, masuje dziąsła nie powodując krwawień - idealna do czyszczenia zębów metodą Bass.

"

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębowe jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z jedzeniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się produkty do remineralizacji szkliwa.

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.