

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/meriden-kiddy-pink-rozowa-szczoteczka-soniczna-dla-dzieci-w-wieku-0-4-lat-0-48-miesiecy-p-1140.html>



Meriden Kiddy PINK różowa szczoteczka soniczna dla dzieci w wieku 0-4 lat 0-48 miesięcy

Cena	51,00 zł
Kod EAN	5907222354414
Producent	Meriden

Opis produktu

Cechy i funkcje szczoteczki:

- wykonuje **16 000 ruchów na minutę** jest optymalna prędkość dostosowana do wieku i delikatnych ząbków mlecznych dziecka
- **2-minutowy timer** wbudowany w szczoteczkę, pomaga przestrzegać zalecanego czasu szczotkowania zębów, a **30-sekundowy timer** informuje o konieczności przejścia do następnego fragmentu łuku zębowego
- mała zaokrąglona główka dopasowana do wieku 0-18mcy i 18-48mcy
- **miękkie i delikatne włókna końcówki** idealne do wrażliwych dziąseł ząbków dziecka
- **podświetlana końcówka** w szczoteczce oraz rękojeść w kształcie pingwinka
- **antypoślizgowa powłoka** rękojeści ułatwia dziecku szczotkowanie zębów
- szczoteczka jest **cicha i wyjątkowo lekka**

Zestaw zawiera:

- 1 szczoteczkę Meriden Kiddy różową
- 2 wymienne końcówki 0-18 m-cy 18-48 m-cy
- 1 baterię (1 AAA),

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębów jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z jedzeniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się [produkty do remineralizacji szkliwa](#).

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.