

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/periokin-gel-zel-pozabiegowy-z-chlorheksydyna-0-20-p-108.html>

PerioKin gel żel pozabiegowy z chlorheksydyną 0,20%



Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	147
Kod EAN	8470001590879
Producent	Kin Laboratorios Hiszpania

Opis produktu

PerioKin gel żel pozabiegowy z chlorheksydyną 0,20%

Żel do stosowania miejscowego z zawartością chlorheksydyny (0,20%) - uznanego przez stomatologów składnika antybakteryjnego. Dzięki wygodnemu aplikatorowi idealny do miejscowego stosowania w zapobieganiu i leczeniu chorób dziąseł i przyzębia, w infekcjach jamy ustnej, zapaleniu i krwawieniu dziąseł oraz w praktyce stomatologicznej. Praktyczny dla pacjentów z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym, a także dla osób ze szczękosciskiem.

Jakie właściwości ma PerioKin gel?

- Posiada wysoką bioadhezyjną
- Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej (może być stosowany m.in. przez osoby z suchością lub innymi schorzeniami śluzówki jamy ustnej, osoby po radioterapii).
- Posiada przyjemny smak.

Wskazania do stosowania żelu PerioKin

- choroby dziąseł i przyzębia
- krwawienie i zapalenie dziąseł
- choroby przyzębia: m.in. parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki
- odleżyny po źle dopasowanych uzupełnieniach protetycznych i ortodontycznych
- redukcja płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego
- usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust
- po ekstrakcjach i zabiegach implantologicznych

Sposób użycia żelu PerioKin

Nanieść żel 2-3 razy dziennie po umyciu zębów, zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa, za pomocą palca, miękkiej szczoteczki do zębów lub pałeczki kosmetycznej, masując lekko dziąsła. W celu precyzyjnego stosowania nałożyć małą ilość żelu za pomocą aplikatora (dołączonego do opakowania), a następnie delikatnie wmasować. Stosować po jedzeniu i przez co najmniej pół godziny nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów. Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą. Nie połykać.

Polecamy również preparat [Periokin Spray](#). Zarówno Periokin Gel jak i Periokin Spray posiadają ten sam skład. Wybór pomiędzy sprayem a żelem zależy od wygody stosowania przez pacjenta lub od wyboru stomatologa

Skład żelu PerioKin

Sorbitol, Aqua, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethylcellulose, Aroma, Chlorhexidine Digluconate (0,20%), Sodium Methylparaben, Methyl Salicylate, Menthol, Citric Acid, Eugenol, d-Limonene, Cinnamal