

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/periokin-spray-antyseptyczny-z-chlorheksydyna-0-20-p-109.html>



PerioKin Spray antyseptyczny z chlorheksydyną 0,20%

Cena	44,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	148
Kod EAN	8436026215289
Producent	Kin Laboratorios Hiszpania

Opis produktu

PerioKin Spray antyseptyczny z chlorheksydyną 0,20%

Spray do stosowania miejscowego z zawartością chlorheksydyny (0,20%) - uznanego przez stomatologów składnika antybakteryjnego.

Dzięki ruchomemu aplikatorowi idealny do miejscowego stosowania w zapobieganiu i leczeniu chorób dziąseł i przyzębia, w infekcjach jamy ustnej, zapaleniu i krwawieniu dziąseł oraz w praktyce stomatologicznej. Praktyczny dla pacjentów z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym, a także dla osób ze szczękostękiem.

PerioKin Spray pierwszy preparat chlorheksydyny w sprayu bez alkoholu.

NIE ZAWIERA ALKOHOLU, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej (może być stosowany m.in. przez osoby z suchością lub innymi schorzeniami śluzówki jamy ustnej, osoby po radioterapii).

Posiada przyjemny smak.

Wskazania do stosowania PerioKin Spray

- choroby dziąseł i przyzębia
- krwawienie i zapalenie dziąseł
- choroby przyzębia: m.in. parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki
- odleżyny po źle dopasowanych uzupełnieniach protetycznych i ortodontycznych
- redukcja płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego
- usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust
- po ekstrakcjach i zabiegach implantologicznych

Sposób użycia sprayu PerioKin

Otworzyć butelkę i umieścić rurkę aplikatora na dozowniku. Nacisnąć aplikator parę razy aż dozownik napęłni się. Rozpylanie wykonywane jest poprzez naciśnięcie dozownika i skierowanie strumienia bezpośrednio na wrażliwe miejsce. Zaleca się wypłukać rurkę aplikatora wodą i osuszyć. Stosować 4-5 dawek (rozpyleń) na wrażliwe miejsce, 2-3 razy dziennie. Przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów.

Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą. Nie połykać.

Co jeszcze stosować podczas preparatu PerioKin

Polecamy również preparat [PerioKin Gel](#). Zarówno [PerioKin Spray](#) jak i PerioKin Gel posiadają ten sam skład. Wybór pomiędzy sprayem, a żelem zależy od wygody stosowania przez pacjenta lub od wyboru stomatologa

Skład sprayu PerioKin

Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, , Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine Digluconate (0,20%), Citric Acid, Methyl Salicylate, Sodium Saccharin, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, d-Limonene, Cinnamal